

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 4.6.19 / 15.01.03

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**ЦИНАРИЗИН СОФАРМА 25 mg таблетки**  
**CINNARIZINE SOPHARMA 25 mg tablets**  
цинаризин (cinnarizine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Цинаризин Софарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Цинаризин Софарма
3. Как да приемате Цинаризин Софарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цинаризин Софарма
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИНАРИЗИН СОФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Цинаризин е продукт от групата лекарства наричани калциеви блокери. Той подобрява мозъчната и периферна микроциркулация. Потиска нистагъма (неконтролирани движения на очите) и другите прояви на вестибуларни нарушения, намалява възбудимостта на лабиринта. Проявява и известно антихистаминово (противоалергично) действие.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЦИНАРИЗИН СОФАРМА**

**Не приемайте Цинаризин Софарма**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Цинаризин;
- ако сте бременна или кърмите.

**Обърнете специално внимание при употребата на Цинаризин Софарма**

- ако страдате от болестта на Паркинсон или сте имали симптоми на екстрапирамидни нарушения (треперене, нарушения в ориентацията и равновесието);
- ако имате хипотония (ниско кръвно налягане);
- ако имате стомашно заболяване.

**Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Едновременното приложение на Цинаризин с алкохол, лекарства повлияващи централната нервна система (ЦНС-депресанти или трициклични антидепресанти - за лечение на депресия) води до взаимно усилване на ефектите им.

Поради антихистаминовите (противоалергичните) си ефекти цинаризин може да доведе до фалшиво отрицателни резултати при дерматологични преби за свръхчувствителност. Това изисква преустановяване на лечението с цинаризин поне 4 дни преди провеждането на тестовете.

Цинаризин може да предизвика фалшиво положителна реакция при тестовете за антидопингов контрол при спортисти.

#### **Прием на Цинаризин Софарма с храни и напитки**

Не трябва да се консумира алкохол по време на лечението с продукта.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

#### **Бременност**

Поради липса на добре контролирани клинични проучвания относно безопасността при бременни жени не се препоръчва употребата на цинаризин през периода на бременността.

#### **Кърмене**

Поради липса на данни за преминаване в кърмата употребата му в периода на кърмене е нежелателна. В случаите на наложителна употреба кърменето трябва да се преустанови.

#### **Шофиране и работа с машини**

Цинаризин Софарма може да предизвика съниливост особено в началото на лечението, което изисква внимателното му прилагане при шофьори и оператори на машини при точна оценка на съотношението полза/риск.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Цинаризин Софарма**

Цинаризин Софарма съдържа лактоза като помощно вещество. Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да вземате този лекарствен продукт.

Лекарственият продукт съдържа пшенично нищесте. Подходящ за хора с цъолиакия. Пациенти с пшеничена алергия (различна от цъолиакия) не трябва да приемат това лекарство.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦИНАРИЗИН СОФАРМА**

Винаги приемайте Цинаризин Софарма точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Вестибуларни симптоми (световъртеж, гадене)**

Възрастни и деца над 12-годишна възраст: по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Деца от 5 до 12 години: по 1/2 таблетка 3 пъти дневно.

Препоръчваните дози не трябва да се превишават.

#### **Профилактика на кинетози (болест на пътуването)**

Възрастни и деца над 12-годишна възраст: по 1 таблетка два часа преди пътуването и след това на всеки 8 часа по 1 таблетка по време на пътуването.

Деца от 5 до 12-годишна възраст: приема се половината от дозата за възрастни.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Цинаризин Софарма**

При предозиране може да се понижи кръвното налягане, да се появят треперене, повръщане, съниливост.

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, обърнете се към Вашия лекар или към най-близкото лечебно заведение.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Цинаризин Софарма**

Ако пропуснете да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както ви е предписано от лекуващия Ви лекар.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Цинаризин Софарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-често са възможни: сънливост, стомашно-чревен дискомфорт; по-рядко: хипотония (понижаване на кръвното налягане), главоболие; при по-възрастни лица, приемащи продължително време цинаризин в по-високи дози е възможно да се появи екстрапирамидна симптоматика (треперене, дезориентация, нарушение в равновесието), включително Паркинсонов синдром (треперене, забавеност на движенията и повишен мускулен тонус), сухота в устата, усилено потоотделение, в редки случаи повишаване на теглото, реакции на свръхчувствителност, много рядко холестатична жълтеница.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦИНАРИЗИН СОФАРМА**

Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Цинаризин Софарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Какво съдържа Цинаризин Софарма**

- Активното вещество е цинаризин 25 mg в една таблетка.
- Другите съставки са: лактозаmonoхидрат; пшенично нишесте; целулоза, микрокристална; повидон; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.

##### **Как изглежда Цинаризин Софарма и какво съдържа опаковката**

Цинаризин Софарма са почти бели, кръгли, двойно изпъкнали таблетки с диаметър 7 mm и без мирис.

50 таблетки в блистер от твърдо, оранжево, прозрачно PVC/алуминиево фолио; 1 блистер в картонена кутия, заедно с листовка.

**Притежател на разрешението за употреба и производител  
СОФАРМА АД**

**ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България**

**Дата на последно одобрение на листовката: август 2008 г.**